

Navn – CPR.nr.	Sygehus, afd.
----------------	---------------

**Vejledning:**

Dette Flow Sheet anvendes som afdelingens behandlings- og undersøgelsesskema (på denne side) samt registreringsskema (på bagsiden). På øverste linie er angivet observationsuge. Herunder anføres de aktuelle datoer. På undersøgelsesskemaet er med O angivet de obligatoriske undersøgelser. På registreringsskemaet er de obligatoriske undersøgelser markeret ved indrammede felter. Disse felter rummer samtidig de oplysninger, som skal indberettes til DBCG. Tidspunkterne for indberetning til DBCG er angivet øverst på registreringsskemaet med en pil.

Ved indberetning fremsendes en fotokopi af registreringsskemaet til:

DBCG sekretariatet, afsnit 2501, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø. Tlf.: 35 38 65 30.

Alternativt kan skemaet faxes på faxnr. 35 26 35 25.

År	Uge nr.	15		18		21		24		36		48	
	Dag, md.												
	6. serie			7. serie									
Inj. cyklofosfamid 600 mg/m <sup>2</sup> dag 1	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>									
Inj. epirubicin 60 mg/m <sup>2</sup> dag 1	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>									
Inj. fluracil 600 mg/m <sup>2</sup> dag 1	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>									
Adjuverende strålebehandling <sup>1)</sup>							<input type="checkbox"/>						
Objektiv us.									O			O	O
Subjektive klager									O			O	O
Hgb., leuk., tromb.	O			O									
Rtg. thorax													
Knoglescintografi / Rtg. skelet													
UL / CT hepar													
1) Efter mastektomi: Ptt. < 70 år med positive lymfeknuder eller tumor > 5 cm (mod thoraxvæg og mod regionale lymfeknuder, dog ikke mod aksil hvis lymfeknudenegativ eller hvis ≥ 10 fjernede lymfeknuder). Ptt. med gennemvækst af prof. resektionsflade (mod thoraxvæg). Efter lumpektomi: Alle ptt. (mod residuale mamma samt mod regionale lymfeknuder som efter mastektomi).													
Evt. bemærkninger.													

Navn - CPR.nr.

## FLOW SHEET (1. ÅR, 2.-4. KVARTAL)

DBCG 04-d CEF

Strålebehandling efter kemoterapi

Højde, cm	Vægt, kg	Overfl., m <sup>2</sup>
-----------	----------	-------------------------

Tidspunkt for indberetning markeret med pil.



År	Uge nr.	15	18	21	24	36	48
	Dag, md.						
		6. serie                    7. serie					
Cyklofosfamid 600 mg/m <sup>2</sup>	= mg						
Epirubicin 60 mg/m <sup>2</sup>	= mg						
Fluracil 600 mg/m <sup>2</sup>	= mg						
Signatur, læge							
Signatur, sygeplejerske							
Adjuverende strålebehandling	0=nej 1=ja						
Hgb.							
Leukocytter ( $\times 10^3/\mu\text{l}$ )							
Trombocytter ( $\times 10^3/\mu\text{l}$ )							

Dosismodifikationer ved hæmatologisk toksicitet på planlagt behandlingsdag.

Leukocytter ( $\times 10^3/\mu\text{l}$ )	Trombocytter ( $\times 10^3/\mu\text{l}$ )	Rel. dosis	
$\geq 2,5$	$\geq 50$	100%	
$< 2,5$	eller	$< 50$	0%, og udsæt næste behandling til værdierne er over dette niveau. Hvis dette ikke er nået på dag 14 gives ved næste behandling kun 75% dosis.

Ved andre bivirkninger som er grad  $\geq III$  reduceres dosis til 75%.

Resultat af objektiv us. <sup>1)</sup>							
Rtg. thorax	0 = + recidiv 1 = + recidiv 9 = ikke us.						
Rtg. skelet							
UL / CT hepar							
Kvalme/opkastning	0 = ingen 1 = let 2 = moderat 3 = svær 4 = livstruende						
Slimhindeaffektion							
Andre (spec. i journal)							
Menstruation <sup>2)</sup>	0 – 4						
Håraffald <sup>3)</sup>	0 – 2						

1) Omfatter undersøgelse med hensyn til recidiv i cikatrice/residuale mamma, modsidig mamma, regionale lymfeknuder.

2) Menstruation: 0=norm.; 1=menoragi; 2=oligomen. (interv. øget &lt;100%); 3=oligomen. (interv. øget 100-200%); 4=amen.

3) Håraffald: 0=normal; 1=let, moderat, som ikke kræver paryk; 2=svær, som kræver paryk.

Evt. bemærkninger.