

Behandling med goserelin (Zoladex) efter operation for brystkræft

Denne information supplerer vores mundtlige information om den anbefalede behandling:

Informationen er tænkt som en hjælp til at få overblik over behandlingen. Dine pårørende kan også have gavn af at læse informationen. Her i denne pjece kan du læse om, hvordan behandlingen foregår, hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med behandlingen og hvilke bivirkninger, du kan opleve.

Hvorfor anbefaler vi behandling med goserelin?

Goserelin er et såkaldt **gonadotropin-releasing hormone** (GnRH), som påvirker de overordnede kønshormoner. Goserelin kan anvendes i forskellige situationer:

- I forbindelse med kemoterapi, der gives før eller efter operation for brystkræft, hvis du har et ønske om at øge muligheden for kunne blive gravid efter kemoterapien - såkaldt æg-besparende behandling.
- I kombination med antihormonbehandling til unge kvinder med øget risiko for tilbagefald, hvor behandling med goserelin sætter dig midlertidigt i overgangsalder, hvilket mindsker risikoen for tilbagefald.

Hvordan gives behandlingen med goserelin?

Goserelin gives som en enkelt injektion under huden (subkutant) hver 4. uge. Det tager kun kort tid at få indsprøjtningen, som gives i maveskindet.

- Æg-besparende behandling: Den første injektion gives 4-7 dage før den første behandling med kemoterapi og fortsætter til og med den sidste kemoterapi
- I kombination med antihormonbehandling: Goserelin gives sædvanligvis 2-5 år.

Generelt vedrørende behandling med goserelin:

Forholdsregler i forhold til familie og venner: Du kan omgås din familie og dine venner som du plejer.

Graviditet:

Du må ikke blive gravid under behandling med kemoterapi og antihormonbehandling. Goserelin beskytter **ikke** mod graviditet - spørg os til råds vedrørende prævention

Bivirkninger:

Goserelin kan som al anden medicin give bivirkninger. De mest almindelige bivirkninger er milde og kan være:

- Reaktion på indstiksstedet (hævelse, rødme, smerter)
- Hede og svedeture
- Tørhed i skeden
- Ledsmerter
- Træthed
- Hovedpine
- Vægtøgning
- Humørforstyrrelser
- Nedsat lyst og evne til seksuelt samvær
- Menstruationslignende blødning i starten af behandlingen, såkaldt afstødningsblødning. Hos de fleste ophører menstruation under behandling med goserelin.

Bivirkningerne til goserelin kan være vanskelige at skelne fra bivirkninger til samtidig kemoterapi eller antihormonbehandling. Fortæl os om de bivirkninger, du oplever undervejs i behandlingen, så vi kan hjælpe dig bedst muligt.