

Navn – CPR. nr.	Start på dosisniveau -1 ved ko-morbiditet og alder > 64 Overvej -1 ved overflade > 2	Dosisniveau	0	-1	-2
		Epirubicin	90 mg/m <sup>2</sup>	72 (80%)	60 (66%)
		Cyklofosfamid	600 mg/m <sup>2</sup>	480 (80%)	396 (66%)

År <input type="text"/>	Uge nr.	0	1	2	3	4	5	6	7
	Dag, md.	<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>	

		1. serie	2. serie	3. serie	4. serie				
Højde	cm	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Vægt	kg	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Epirubicin	mg	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cyklofosfamid	mg	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ovariel suppression	0=nej, 1=ja	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Vækstfaktor	0=nej, 1=ja	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Zoledronsyre	0=nej, 1=ja	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Tumormål	UL	mm	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	MR	mm	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**Hæmatologisk toksicitet** hvis neutrocytter < 1,5 x 10<sup>3</sup> µl eller thrombocytter < 100 x 10<sup>3</sup> µl på dag 1 af en planlagt serie så udsættes behandlingen. Overvej profylaktisk vækstfaktor ved EC givet med 2 ugers interval (ddEC), og overvej at reducere dosis 1 niveau ved febril neutropeni og/eller neutrocytter < 0,5 x 10<sup>3</sup> µl i 3 dage trods vækstfaktor. Alternativ kan intervallet øges fra 2 til 3 uger.

Angiv på dag 1	Neutrocytter	x10 <sup>3</sup> /µl	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Leukocytter	x10 <sup>3</sup> /µl	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Hæmoglobin	mmol/l	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Trombocytter	x10 <sup>3</sup> /µl	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**Ikke-hæmatologisk toksicitet** graderes af patienten<sup>1</sup> ved brug af toksicitetsskemaet. Ved grad 3 eller 4 toksicitet bør dosisreduktion overvejes. Under uge 0 tages bivirkninger registreret før start af kemoterapi medens bivirkninger registreret efter 1. serie kemoterapi registreres under uge 3 osv.

Febril neutropeni	0 – 4 <sup>1</sup>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Slimhindeaffektion	0 – 4	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Diarré	0 – 4	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Muskel- og ledsmerter	0 – 4	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nervepåvirkning	0 – 4	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Hududslæt	0 – 3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Negleforandringer	0 – 2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Opkastning	0 – 4	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kvalme	0 – 4	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Træthed	0 – 4	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Væskeophobning	0 – 3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Andre (noter i journal)	0 – 4	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Menstruation	0 – 3 <sup>2</sup>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kølehandsker /kølefutter	0=nej, 1=ja	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

<sup>2</sup> Menstruation: 0=regelmæssig; 1= kraftigere end vanlig; 2=øget interval/sparsom; 3=ophørt

Kommentar

Navn – CPR. nr.		Justeres ved toksicitet				Dosisniveau			0	-1	-2		
						Paclitaxel	80 mg/m <sup>2</sup>	64 (80%)	53 (66%)	AUC 3			
						Carboplatin	AUC 5	AUC 4	AUC 3				
År	Uge nr.	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Dag, md.												
		5. serie			6. serie			7. serie			8. serie		
	Højde	cm											
	Vægt	kg											
	Paclitaxel	mg											
	Carboplatin	mg											
	Ovariel suppression	0=nej, 1=ja											
	Vækstfaktor	0=nej, 1=ja											
	Zoledronsyre	0=nej, 1=ja											
Tumormål	UL	mm											
	MR	mm											
<p><b>Hæmatologisk toksicitet</b> hvis neutrocytter &lt; 1,5 x 10<sup>3</sup> µl eller thrombocytter &lt; 100 x 10<sup>3</sup> µl på dag 1 af en planlagt serie så udsættes behandlingen. Overvej profylaktisk vækstfaktor når carboplatin gives med paclitaxel, og overvej at reducere dosis 1 niveau ved febril neutropeni og/eller neutrocytter &lt; 0,5 x 10<sup>3</sup> µl i 3 dage trods vækstfaktor.</p>													
Angiv på dag 1	Neutrocytter	x10 <sup>3</sup> /µl											
	Leukocytter	x10 <sup>3</sup> /µl											
	Hæmoglobin	mmol/L											
	Trombocytter	x10 <sup>3</sup> /µl											
<p><b>Nefrotoksicitet</b> udelad carboplatin ved GFR &lt; 50 ml/min</p>													
Angiv GFR på dag 1	ml/min												
<p><b>Ikke-hæmatologisk toksicitet</b> graderes af patienten<sup>1</sup> ved brug af toksicitetsskemaet. Ved grad 3 eller 4 toksicitet bør dosisreduktion overvejes. Under uge 0 tages bivirkninger registreret før start af kemoterapi medens bivirkninger registreret efter 1. serie kemoterapi registreres under uge 3 osv.</p>													
	Febril neutropeni	0 – 4 <sup>1</sup>											
	Slimhindeaffektion	0 – 4											
	Diarré	0 – 4											
	Muskel- og ledsmerter	0 – 4											
	Nervepåvirkning	0 – 4											
	Hududslæt	0 – 3											
	Negleforandringer	0 – 2											
	Opkastning	0 – 4											
	Kvalme	0 – 4											
	Træthed	0 – 4											
	Væskeophobning	0 – 3											
	Andre (noter i journal)	0 – 4											
	Menstruation	0 – 3 <sup>2</sup>											
	Kølehandsker /kølefutter	0=nej, 1=ja											
<p><sup>2</sup> menstruation: 0=regelmæssig; 1= kraftigere end vanlig; 2=øget interval/sparsom; 3=ophørt</p>													
<p>Kommentar</p>													