

Navn – CPR. nr.		Start på dosisniveau -1 ved høj alder eller betydende ko-morbiditetsscore				Dosisniveau		0	-1	-2				
						Paclitaxel		80 mg/m <sup>2</sup>	64 (80%)	53 (66%)				
År	<input type="text"/>	Uge nr.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dag, md.												
		1. serie			2. serie			3. serie			4. serie			
		Højde	cm											
		Vægt	kg											
Paclitaxel		mg												
Ovariel suppression		0=nej, 1=ja												
Vækstfaktor		0=nej, 1=ja												
Trastuzumab		mg												
Zoledronsyre		0=nej, 1=ja												
Tumormål	UL	mm												
	MR	mm												
<b>Hæmatologisk toksicitet</b> hvis neutrocytter < 1,0 x 10 <sup>3</sup> µl eller trombocytter < 50 x 10 <sup>3</sup> µl på dag 1 af en planlagt serie så udsættes behandlingen. Tilføj vækstfaktor ved febril neutropene eller ved neutrocytter < 0,5 x 10 <sup>3</sup> µl i 3 dage.														
Angiv på dag 1	Neutrocytter	x10 <sup>3</sup> /µl												
	Leukocytter	x10 <sup>3</sup> /µl												
	Hæmoglobin	mmol/L												
	Trombocytter	x10 <sup>3</sup> /µl												
<b>Ikke-hæmatologisk toksicitet</b> graderes af patienten ved brug af toksicitetsskemaet. Ved grad 3 eller 4 toksicitet bør dosisreduktion overvejes.														
Febril neutropeni		0 – 4 <sup>1</sup>												
Slimhindeaffektion		0 – 4												
Diarré		0 – 4												
Muskel- og ledsmerter		0 – 4												
Nervepåvirkning		0 – 4												
Hududslæt		0 – 3												
Negleforandringer		0 – 2												
Opkastning		0 – 4												
Kvalme		0 – 4												
Træthed		0 – 4												
Væskeophobning		0 – 3												
Andre (noter i journal)		0 – 4												
Menstruation		0 – 3 <sup>2</sup>												
Kølehandsker /kølefutter		0=nej, 1=ja												
<sup>2</sup> menstruation: 0=regelmæssig; 1= kraftigere end vanlig; 2=øget interval/sparsom; 3=ophørt														
Kommentar														

Navn – CPR. nr.		Dosisniveau												
		0	-1	-2	Justeres ved toksicitet									
		Epirubicin	90 mg/m <sup>2</sup>	72 (80%)	60 (66%)									
		Cyklofosamid	600 mg/m <sup>2</sup>	480 (80%)	396 (66%)									
År	Uge nr.	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	Dag, md.													
		5 serie			6. serie			7. serie			8. serie			
	Højde	cm												
	Vægt	kg												
	Epirubicin	mg												
	Cyklofosamid	mg												
	Ovariel suppression	0=nej, 1=ja												
	Vækstfaktor	0=nej, 1=ja												
	Zoledronsyre	0=nej, 1=ja												
Tumormål	UL	mm												
	MR	mm												
<p><b>Hæmatologisk toksicitet</b> hvis neutrocytter &lt; 1,5 x 10<sup>3</sup> µl eller trombocytter &lt; 50 x 10<sup>3</sup> µl på dag 1 af en planlagt serie så udsættes behandlingen. Overvej at tilføje vækstfaktor eller at reducere dosis 1 niveau ved febril neutropeni og/eller neutrocytter &lt; 0,5 x 10<sup>3</sup> µl i 3 dage trods vækstfaktor.</p>														
Angiv på dag 1	Neutrocytter	x10 <sup>3</sup> /µl												
	Leukocytter	x10 <sup>3</sup> /µl												
	Hæmoglobin	mmol/l												
	Trombocytter	x10 <sup>3</sup> /µl												
<p><b>Ikke-hæmatologisk toksicitet</b> graderes af patienten<sup>1</sup> ved brug toksicitetsskemaet. Ved grad 3 eller 4 toksicitet bør dosisreduktion overvejes. Under uge 0 tages bivirkninger registreret før start af kemoterapi medens bivirkninger registreret efter 1. serie kemoterapi registreres under uge 3 osv.</p>														
	Febril neutropeni	0 – 4 <sup>1</sup>												
	Slimhindeaffektion	0 – 4												
	Diarré	0 – 4												
	Muskel- og ledsmerter	0 – 4												
	Nervepåvirkning	0 – 4												
	Hududslæt	0 – 3												
	Negleforandringer	0 – 2												
	Opkastning	0 – 4												
	Kvalme	0 – 4												
	Træthed	0 – 4												
	Væskeophobning	0 – 3												
	Andre (noter i journal)	0 – 4												
	Menstruation	0 – 3 <sup>2</sup>												
	Kølehandsker /kølefutter	0=nej, 1=ja												
<p><sup>2</sup> Menstruation: 0=regelmæssig; 1= kraftigere end vanlig; 2=øget interval/sparsom; 3=ophørt</p>														
<p>Kommentar</p>														