

Navn – CPR. nr.	Start på dosisniveau -1 ved høj alder eller betydende ko-morbiditetsscore	Dosisniveau	0	-1	-2
		Paclitaxel	80 mg/m <sup>2</sup>	64 (80%)	53 (66%)

År <input type="text"/>	Uge nr.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dag, md.												

		1. serie			2. serie			3. serie			4. serie		
	Højde	cm											
	Vægt	kg											
	Paclitaxel	mg											
	Ovariel suppression	0=nej, 1=ja											
	Vækstfaktor	0=nej, 1=ja											
	Trastuzumab	mg											
	Zoledronsyre	0=nej, 1=ja											

**Hæmatologisk toksicitet** hvis neutrocytter < 1,5 x 10<sup>3</sup> µl eller thrombocytter < 50 x 10<sup>3</sup> µl på dag 1 af en planlagt serie så udsættes behandlingen. Ved febril neutropeni og/eller neutrocytter < 0,5 x 10<sup>3</sup> µl i 3 dage så overvej at reducere dosis 1 niveau (node negative).

Angiv på dag 1	Neutrocytter	x10 <sup>3</sup> /µl											
	Leukocytter	x10 <sup>3</sup> /µl											
	Hæmoglobin	mmol/L											
	Trombocytter	x10 <sup>3</sup> /µl											

**Ikke-hæmatologisk toksicitet** graderes af patienten ved brug af toksicitetsskemaet. Ved grad 3 eller 4 toksicitet bør dosisreduktion overvejes.

Febril neutropeni	0 – 4 <sup>1</sup>												
Slimhindeaffektion	0 – 4												
Diarré	0 – 4												
Muskel- og ledsmerter	0 – 4												
Nervepåvirkning	0 – 4												
Hududslæt	0 – 3												
Negleforandringer	0 – 2												
Opkastning	0 – 4												
Kvalme	0 – 4												
Træthed	0 – 4												
Væskeophobning	0 – 3												
Andre (noter i journal)	0 – 4												
Menstruation	0 – 3 <sup>2</sup>												
Kølehandsker /kølefutter	0=nej, 1=ja												

<sup>2</sup> menstruation: 0=regelmæssig; 1= kraftigere end vanlig; 2=øget interval/sparsom; 3=ophørt

Kommentar

Navn – CPR. nr.													
År <input type="text"/>	Uge nr.	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Dag, md.	<input type="text"/>			<input type="text"/>			<input type="text"/>			<input type="text"/>		
		5. serie			6. serie			7. serie			8. serie		
Højde		cm											
Vægt		kg											
Ovariel suppression	0=nej, 1=ja												
Tamoxifen	0=nej, 1=ja												
Letrozol	0=nej, 1=ja												
Trastuzumab	0=nej, 1=ja				<input type="text"/>			<input type="text"/>			<input type="text"/>		
Zoledronsyre	0=nej, 1=ja												
<b>Ingen kemoterapi i serie 5 – 8 og hæmatologi tages kun på specifik indikation</b>													
Angiv på dag 1	Neutrocytter	x10 <sup>3</sup> /µl											
	Leukocytter	x10 <sup>3</sup> /µl											
	Hæmoglobin	mmol/L											
	Trombocytter	x10 <sup>3</sup> /µl											
<b>Ikke-hæmatologisk toksicitet</b> graderes af patienten ved brug af toksicitetsskemaet. Ved grad 3 eller 4 toksicitet bør dosisreduktion overvejes.													
Febril neutropeni	0 – 4 <sup>1</sup>												
Slimhindeaffektion	0 – 4												
Diarré	0 – 4												
Muskel- og ledsmerter	0 – 4												
Nervepåvirkning	0 – 4												
Hududslæt	0 – 3												
Negleforandringer	0 – 2												
Opkastning	0 – 4												
Kvalme	0 – 4												
Træthed	0 – 4												
Væskeophobning	0 – 3												
Andre (noter i journal)	0 – 4												
Menstruation	0 – 3 <sup>2</sup>												
Kølehandsker /kølefutter	0=nej, 1=ja												
<sup>2</sup> menstruation: 0=regelmæssig; 1= kraftigere end vanlig; 2=øget interval/sparsom; 3=ophørt													
Kommentar													